

## **VAŽNA PREPORUKA POSJEDNICIMA SVINJA !**

Izbjegavajte stavljanje svinja u promet najmanje 30 dana nakon uvođenja novih svinja ili vraćanja svinja sa sajmova ili drugih mjesta, na gospodarstvo.



### **MJERE ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE KSK**

U slučaju izbijanja KSK provodi se «stamping out» bez cijepljenja tj. usmrćivanje svih svinja na zaraženom gospodarstvu i svinja koje su bile u izravnom ili neizravnom kontaktu sa zaraženima; neškodljivo uklanjanje trupla svinja (na način da se uništi izvor i spriječi širenje zaraze); čišćenje i dezinfekcija. Za dezinfekciju se najčešće koristi 2% NaOH ili 2% formalin.

# **VAŽNO!!!**

**POSJEDNIK SVINJA  
MORA SVAKU SUMNJU NA  
KSK ODMAH PRIJAVITI  
VETERINARU, KAKO U SLUČAJU  
POTVRDE KSK NE BI DOVEO U  
PITANJE NAKNADU ŠTETE OD  
DRŽAVE, ZA USMRĆENE SVINJE**



**Za daljnje informacije molimo kontaktirajte svoga područnog veterinara ili Upravu za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (tel. 01-610-6207)**

Slike:

Uprava za veterinarstvo

[www.defra.gov.uk](http://www.defra.gov.uk)

[www.stensbys.blogspot.com](http://www.stensbys.blogspot.com)



MINISTARSTVO  
POLJOPRIVREDE,  
RIBARSTVA I  
RURALNOG RAZVOJA  
UPRAVA ZA VETERINARSTVO



## **KLASIČNA SVINJSKA KUGA**

**Sprječavanje širenja bolesti**



**UPRAVA ZA VETERINARSTVO**

Miramarska 24, 10000 Zagreb

☎ 01 610 6207

✉ [veterinarstvo@mps.hr](mailto:veterinarstvo@mps.hr)

[www.mps.hr](http://www.mps.hr)

**ožujak, 2011.**

## KLASIČNA SVINJSKA KUGA - UKRATKO O BOLESTI

Klasična svinjska kuga (KSK) je **naročito opasna** virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja. KSK uzrokuje značajne ekonomske štete za sve subjekte u lancu proizvodnje svinja, (posjednike svinja, mesnu industriju) te za državu.



## KAKO SE BOLEST ŠIRI ?

Najčešći izvor infekcije su životinje u inkubaciji tj. u vrijeme kad još ne pokazuju znakove bolesti i životinje zaražene virusom koje ne pokazuju vidljive kliničke znakove bolesti. Takve životinje svojim sekretima i ekskretima (mokraćom, fecesom, iscjetkom iz nosa i očiju, spermom) izlučuju virus u svoju okolinu. Stavljanjem u promet takvih životinja bolest se najčešće širi na veće udaljenosti, izravno preko zaraženih životinja ili neizravno kontaminiranim prijevoznim sredstvima.

Osobe koje su u kontaktu sa svinjama (timaritelji, pratitelji životinja, uzgajivači, trgovci i drugi) mogu na svojoj odjeći, obući, kosi, rukama i opremi prenositi uzročnika **KSK** i tako širiti bolest.

## DA BI BOLEST BILA ŠTO RANIJE OTKRIVENA I DA SE SPRIJEČI ŠIRENJE BOLESTI OBVEZNO JE

- bez odgađanja, prijaviti veterinaru svinje koje pokazuju znakove KSK i uginuća svinja, a veterinar će obvezno pretražiti uzorke organa uginulih domaćih i divljih svinja
- pri svakoj upotrebi antibiotika, kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne temperature i poboljšanja zdravstvenog statusa, veterinar će uzeti odgovarajuće uzorke, kako bi se isključila KSK
- onemogućiti izravni i neizravni kontakt između domaćih i divljih svinja
- provođenje preventivnih biosigurnosnih mjera za smanjenje opasnosti od unošenja virusa KSK u uzgoje svinja

## U SVRHU SPRJEČAVANJA IZBIJANJA KSK, NA PODRUČJU CIJELE ZEMLJE ZABRANJENO JE

- korištenje napoja u hranidbi svinja (otpaci ili ostaci hrane iz restorana, industrijskih kuhinja, bolničkih kuhinja, klaonica,..)
- prijevoz i kretanje svinja izvan farme, uzgoja ili dvorišta radi prirodnog pripusta u drugim uzgojima, farmama ili dvorištima
- ulazak rasplodnih svinja u druge uzgoje radi pripusta
- stavljanje u promet mesa svinja izravno iz dvorišta
- pašno držanje svinja, osim ukoliko se svinje drže na otvorenom tako da ih stalno čuva i nadzire posjednik i da se drže u prostoru koji je registriran i ima JIBIG i druge podatke sukladno posebnim propisima
- kontakt s divljim svinjama (domaće svinje moraju biti potpuno izolirane od divljih svinja tako da ne mogu doći u izravan i neizravan kontakt)
- ostavljanje ostataka mesa i proizvoda od mesa svinja na izletištim, odmorištima i ilegalnim odlagalištima otpada