



MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
<http://www.veterinarstvo.hr>

KLASA: 322-02/20-01/58
URBROJ: 525-10/0525-21-1
Zagreb, 31. ožujka 2021. godine

PROGRAM NADZIRANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Sadržaj

Sadržaj	2
1. UVOD	3
2. BOLESTI	4
3. PUTEVI I MEHANIZMI ZARAZE	8
4. LANAC PRIJENOSA U POPULACIJI DIVLJIH SVINJA	9
5. GLAVNE ZNAČAJKE ASK, ŠIRENJA ZARAZE I MJERA KOJE SE PROVODE	10
6. PRAVNA I ZNANSTVENA OSNOVA	11
7. NADLEŽNA TIJELA I ORGANIZACIJE UKLJUČENE U PROVEDU PROGRAMA	12
8. CILJEVI I PROVEDBA PROGRAMA	12
9. UZORKOVANJE, LABORATORIJSKO PRETRAŽIVANJE I DOSTAVA LEŠINA .	15
10. FINANCIRANJE	18

1. UVOD

Afrička svinjska kuga (ASK) je zarazna virusna bolest svinja. Godine 2007. ASK pojavila se u Kavkazu i od tada se proširila na nekoliko zemalja istočne i sjeverne Europe. Epidemija velikih razmjera proširila se tisućama kilometara od svoje izvorne točke unosa u Gruziji te, osim endemičnog ukorjenjivanja kod domaćih svinja, bolest je napoljetku prešla na populaciju divljih svinja. U razdoblju 2014.-2015. postalo je očito da se cirkulacija ovog virusa u prirodnim ekosustavima razvila u samoodrživ epidemiološki ciklus. Do sada je bolest već postala endemična u populaciji divljih svinja u nekoliko zemalja i nastavlja širiti svoj raspon u Europi, što uzrokuje ozbiljnu zabrinutost. Kontrola ove silvatične epidemije ASK vrlo je zahtjevna zadaća za veterinarska tijela, s obzirom na složenost epidemiologije bolesti, nedostatka prethodnog iskustva, zemljopisnog opsega problema bez presedana, te njezine prekogranične i višesektorske prirode.

Zabrinjavajuća je činjenica da se ova bolest nezaustavljivo širi na području Europske unije (EU) od 2014. godine uzrokujući vrlo velike ekonomski štete i posljedice u vidu trgovinskih problema za zaražene države.

ASK je time postala najvažnija tema u tijelima Europske komisije (EK), a posebna važnost ASK za cijelu EU dodatno je naglašena ministarskim konferencijama održanim tijekom 2018. i 2019. godine na kojima su donijeti zaključci o budućim aktivnostima kako bi se zajedničkim naporima svih država članica pokušalo zaustaviti daljnje širenje ASK. Posebno je zabrinjavajuće da se ASK može proširiti na velike udaljenosti zbog ljudskog faktora, unošenjem i odbacivanjem ilegalnih proizvoda od zaraženog svinjskog mesa ili zaraženom opremom. Jednako tako zabrinjava i činjenica da je Rumunjska u gotovo cijelom svojem području zahvaćena ASK što može ukazivati da je ova bolest u Rumunjskoj van kontrole.

Dodatno, povećanju rizika doprinosi i činjenica da se ASK pojavila na području Republike Srbije i to u domaćih i divljih svinja. Iako je ASK po dostupnim podacima iskorijenjena u domaćih svinja, širenje ASK u populaciji divljih svinja upućuje na vrlo veliku mogućnost skorog izbijanja ASK i u domaćih svinja te time i većim rizikom od prenošenja virusa ljudskim faktorom na područje Republike Hrvatske.

Zbog svega navedenog, Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane (UVSH), kao nadležno tijelo za zdravlje životinja u Republici Hrvatskoj (RH), prati situaciju po pitanju širenja ASK na području EU te aktivno sudjeluje u svim aktivnostima koje provodi EK kako bi se posljedice širenja ASK svele na najmanju moguću mjeru. Osim mjera regionalizacije, određenih Provedbenom Odlukom 2014/709/EU, RH provodi i dodatne, preventivne mjere u skladu s preporukama EK, a za koje se smatra da mogu pridonijeti smanjenju rizika od unosa i širenja virusa ASK na području naše zemlje.

Preventivne mjere donesene su na temelju zaključaka Stručnog tijela za ASK kojeg čine stručnjaci iz različitih područja i institucija, a koje je osnovano rješenjem ministra poljoprivrede od 26. lipnja 2018. godine sukladno Nacionalnom kriznom planu za ASK, s ciljem osiguravanja stručne pomoći nadležnom tijelu. U okviru Stručnog tijela za ASK provedena je preliminarna procjena rizika od ASK kojom je rizik procijenjen kao vrlo visok, ne samo s obzirom na mogući unos virusa, već i s obzirom na dugoročne negativne ekonomski i socijalne posljedice u slučaju epidemije ASK u RH. Kao glavni rizici prepoznati su: blizina zaraženog područja, visoka gustoća divljih svinja, RH kao turistička zemlja, veliki broj manjih uzgoja te niska razina biosigurnosti u manjim uzgojima svinja. Također je usvojena i Nacionalna strategija koja uključuje provedbu javne kampanje u svrhu podizanja svijesti o ASK, podizanje razine biosigurnosti na farmama svinja, upravljanje populacijom divljih svinja, primjenu biosigurnosnih mjera prije, tijekom i nakon lova te druge mjere koje mogu pridonijeti smanjenju rizika od ASK.

Kao rezultat provedenih aktivnosti, donesene su dvije Naredbe: Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (trenutno važeća: „Narodne novine“, broj 28/21), (u dalnjem tekstu: Naredba) i Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači („Narodne novine“, broj 115/18, 98/20) kojima su propisane preventivne mjere kako za posjednike, uzgajivače svinja, tako i za lovce, odnosno lovoovlaštenike. Dodatno, Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovom financiranju (u dalnjem tekstu: godišnja Naredba) propisane su dodatne mjere u odnosu na biosigurnost za uzgoje svinja koji se drže na otvorenom (dvostruka ograda).

Osim ovih mjera, jedna od glavnih aktivnosti je podizanje svijesti o ASK te se u tu svrhu provode edukacije svih uključenih dionika.

U ožujku 2019. godine započela je provedba kategorizacije farmi svinja u odnosu na biosigurnost sa svrhom upoznavanja posjednika svinja o ASK te važnosti kontinuirane primjene i održavanja svih propisanih biosigurnosnih mjera. Provedba kategorizacije provodila se tijekom 2019. godine te je izmjenom Naredbe predviđena i mogućnost rekategorizacije za posjednike koji su unaprijedili biosigurnosne mjere na farmama.

Kako bi se što je više moguće smanjio rizik od unosa i širenja ASK, nužna je suradnja svih nadležnih državnih tijela uključujući policiju i carinu te visoka svijest o ASK svih posjednika svinja, veterinara, veterinarskih inspektora, mesne industrije, uzgajivačkih organizacija te šire javnosti.

Obzirom na iskustvo RH i dugoročnim, negativnim posljedicama epidemije klasične svinjske kuge od 2006. do 2008. godine, nužno je osigurati da RH što je duže moguće ostane država slobodna od ASK.

Program nadziranja ASK (u dalnjem tekstu: Program) propisuje način i postupanje s ciljem ranog otkrivanja unosa virusa ASK.

2. BOLESTI

Afrička svinjska kuga (ASK) je virusna zarazna bolest svinja (domaćih i divljih) koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice sa mortalitetom koji može doseći i 100%.

Afrička svinjska kuga uzrokovana je DNK virusom koji pripada porodici *Asfarviridae*. Utječe samo na vrste koje pripadaju porodici *Suidae*. Takve vrste u Europi su domaće svinje i divlje svinje, koje su jedine prijempljive vrste. Pokazuju slične kliničke znakove i stope smrtnosti. Iako je poznato da ukupno dvadeset i tri genotipa virusa cirkuliraju u Africi, u Europi se trenutno pojavljuju samo dva genotipa. Od 2007. godine, genotip II se opsežno proširio u istočnoj Europi, dok je genotip I prijavljen samo na Sardiniji, Italija (Gabriel i sur., 2011.). Virus genotipa II koji cirkulira u Europi ima vrlo visoku stopu smrtnosti i za gotovo svaku zaraženu svinju, bez obzira je li divlja ili domaća, bolest je kobna. Genetska struktura virusa ASK prilično je stabilna, stoga je upotreba molekularne epidemiologije za određivanje izvorišta virusa od ograničene pomoći.

Inkubacija može trajati od 4 do 19 dana, ali se sukladno Priručniku za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravље животinja (OIE) računa trajanje inkubacije od 15 dana.

Prvi klinički znak bolesti obično je visoka tjelesna temperatura (više od 40°C), praćena depresijom, gubitkom apetita, brzim i teškim disanjem, te iscjetkom iz nosa i očiju. Svinje su nekoordinirane u kretanju i nakupljaju se u skupine. Krmače mogu pobaciti u svim stadijima gravidnosti. Kod nekih svinja može doći do povraćanja i opstipacije, dok se kod nekih može razviti krvavi proljev. Javljuju se vidljiva potkožna krvarenja, posebno na ekstremitetima i

uškama. Prije smrti može doći do kome, koja se javlja jedan do sedam dana nakon pojave kliničkih znakova.

U divljih svinja uočava se nemogućnost kretanja, ležanje, a u rijetkom slučajevima krvavi iscijedak iz nosa ili krvavi proljev.

Patoanatomski nalazi pokazuju tipičan hemoragijski sindrom s općom kongestijom trupa, nakupljanjem krvi u prsnoj i trbušnoj šupljini, povećanom tamnom slezenom, hemoragičnim limfnim čvorovima koji nalikuju ugrušcima krvi, posebno bubrežni i gastrohepatični limfni čvorovi, petehijalnim krvarenjima po bubrežima (kortikalnim i medularnim piramidama i bubrežnoj nakapnici), serozi abdomena, sluznici želuca i crijeva i srcu (epikard i endokard), hidrotoraksom i petehijama po pleuri.

Ekstremna otpornost na okoliš patogena, ključ je za razumijevanje epidemiologije ASK-a i razvijanje odgovarajućih mjera i intervencija u svrhu kontrole: kako u sektoru svinjogoštva, tako i u prirodnim uvjetima, kada cirkulira u populaciji divljih svinja.

Trenutno dostupne informacije o potencijalu različitih matriksa pogodnih za olakšanje širenja virusa su:

Oralno-nazalne izlučevine/sekreti

Virus je prisutan i u nazalnim i oralnim sekretima zaraženih životinja i može se otkriti čak i prije pojave u krvi i kliničkih znakova; količina virusa koji se umnožio i izlučio relativno je niska, međutim, dovoljna je za poticanje novih zaraza. U oralno-nazalnim tekućinama, virus se umnožava i izlučuje nekoliko dana (2-4), dok njegov poluživot nije poznat. Vjerojatno je da će oralne i nazalne tekućine biti uključene u širenje zaraze izravnim kontaktom.

Krv

Virus se detektira u krvi zaraženih divljih svinja 2-5 dana nakon izlaganja. Otkrivanje virusa u krvi istodobno je s pojavom kliničkih znakova. Virus se masivno umnožava i izlučuje u krvi gdje može preživjeti 15 tjedana na sobnoj temperaturi, mjesecima na 4°C i neodređeno dugo kada je zamrznut. Kontaminacija tla krvlju, objekata u lovištima i alata, uključujući noževe, odjeću i automobile koji se koriste za prijevoz zaraženih lovlijenih životinja važan je izvor lokalne postojanosti i daljnog širenja virusa.

Sirovo meso

Virus je prisutan i u mesu bolesnih životinja. Budući da je virus otporan na raspadanje, može preživjeti više od 3 mjeseca u mesu i iznutricama. Virus ostaje zarazan gotovo godinu dana u suhom mesu i masti, te preživljava na neodređeno vrijeme u zamrznutom mesu. Meso također predstavlja važan izvor za lokalno održavanje i moguće daljnje širenje virusa. Zamrznuto meso zaražene divlje svinje može godinama osigurati preživljavanje virusa, i time predstavlja mogući izvor novih epidemija.

Lešine

Kao i u mesu, virus može preživjeti vrlo dugo u cijelim lešinama, ovisno o temperaturi okoline. Zamrznute lešine mogu mjesecima održavati virus zaraznim, što znači da patogen može prezimeti čak i u slučaju privremenog odsustva bilo kojeg živog domaćina i ponovno započeti novi ciklus prijenosa kada divlja svinja sklona zarazi dođe u kontakt s odmrznutom lešinom narednog proljeća. U prirodnoj povijesti ASK-a, u ciklusu divljih svinja, preživljavanje virusa u lešinama igra ključnu ulogu: virus živi duže od domaćina; kada zaražena divlja svinja umre, virus ostaje zarazan u lešini tijekom duljeg vremenskog razdoblja. U takvom epidemiološkom okviru, sigurno uklanjanje lešina iz okoline i odlaganje

istih jedna je od najvažnijih mjera za kontrolu bolesti, bez čega je iskorjenjivanje ASK-a iz populacije divljih svinja gotovo nemoguće.

Iznutrice

Stope preživljavanja virusa u iznutricama slične su onima u lešinama. Kad god se zaraženoj životinji vadi utroba na terenu, iznutrice (uključujući unutrašnje organe, kožu, glavu i druge dijelove tijela) postaju važan potencijalni izvor virusa. Posebno zimi, kada se odvijaju lovne aktivnosti, nepropisno zbrinute iznutrice imaju velik potencijal za povećanje rizika od sekundarnih zaraza i širenja bolesti.

Fekalije i urin

Obje izlučevine su zarazne, a temperaturu okoline određuje poluživot virusa u njima. Virus ASK genotipa II preživjava duže u urinu u usporedbi s fekalijama. Poluživot u urinu kreće se od 15 dana pri 4 °C do 3 dana pri 21 °C. Poluživot u fekalijama kreće se od 8 dana pri 4 °C do 5 dana pri 21 °C. Poluživot ostalih genotipova ASK-a u fekalijama je duži: u rasponu od 2 do 4 godine (de Carvalho Ferreira i sur., 2014.). Enzimi (proteaze i lipaze) snažno utječu na poluživot virusa, koje proizvode bakterije koje koloniziraju fekalije i urin, pa točno vrijeme preživljavanja u šumi u kojoj ASK aktivno cirkulira nije potpuno usporedivo s procjenama dobivenim u laboratorijskim uvjetima. Međutim, zaražene fekalije i urin povećavaju virusnu kontaminiranost staništa i time pridonose riziku od mogućeg sekundarnog širenja virusa putem neizravno kontaminiranih čizama, guma, alata za lov itd. Na hranilištima, na kojima su bile mnoge životinje, kontaminacija zaraženim fekalijama ili urinom vjerojatno će povećati stope sekundarnih zaraza, čak i ako su sve zarazne lešine sigurno zbrinute.

Tlo

Virusni DNK otkriven je u tlu nakon uklanjanja tijela zaraženih divljih svinja; također, tlo ispod raspadnute lešine može biti kontaminirano virusom čak i nakon što se cijela lešina raspala. Preživljavanje virusa u ovim uvjetima vjerojatno ovisi o temperaturi okoline i svojstvima tla, ali potrebno je više istraživanja kako bi se razumjeli takvi čimbenici rizika u ciklusu prijenosa bolesti.

Insekti strvinari

Pretpostavlja se da ASK virus može potencijalno preživjeti u insektima (odraslim jedinkama ili u fazama larve) koji se hrane zaraznim lešinama. Međutim, umatoč činjenici da su pronađene ličinke muhe zlatare (*Lucilla sericata*) i muhe zujare (*Calliphora vicina*) koje su bile kontaminirane DNK-om, zaravnost virusa nije mogla biti dokazana (EFSA, 2010., Forth i sur., 2018.). Nije poznato ostaje li virus zarazan u drugim beskralješnjačkim strvinarima. Budući da se divlje svinje često hrane insektima strvinarima, njihova prisutnost mogla bi biti privlačna i povećati broj kontakata između zaraznih lešina i prijemljivih divljih svinja.

Hematofagni insekti i krpelji

Stajska muha (*Stomoxys calcitrans*) smatra se mehaničkim vektorom virusa koji može nositi virus 48 sati (Mellore i sur., 1987.), ali uloga te muhe u ciklusu prijenosa u Europi nije u potpunosti istražena. Uloga drugih člankonožaca koji se hrane krvlju nije jasna, posebice u divljini. Krpelji iz roda *Ornithodoros* koji su izrazito aktivni u prirodnom ciklusu prijenosa ASK-a u Africi ne pojavljuju se u trenutno pogodenim dijelovima europskog kontinenta.

Kontaminirani predmeti

Visoka otpornost virusa na okoliš podrazumijeva da je njegov prijenos moguć putem bilo kojeg predmeta (kontaminiranog, neživog predmeta koji može prenositi zarazne organizme, kao što su cipele, odjeća, vozila, noževi, oprema itd.).

Prehrambeni/kuhinjski otpad

Zbog velike otpornosti virusa, hrana koja nije termički obrađena (kobasice, salama, šunka i sl.), kao i ostaci hrane koji potječu od zaraženih životinja (domaća i divlja svinja) koji su slučajno uneseni u stanište divljih svinja mogu dovesti do epidemije ASK-a. Prehrambeni otpad smatra se glavnim izvorom virusa u širenju ASF-a na veće udaljenosti.

Trava i druge biljke

Zaražena divlja svinja može kontaminirati travu i biljke (tj. zelene kukuruzne biljke koje oštećuju divlje svinje); hranjenje domaćih svinja krmivom koje sadrži zeleno bilje zabranjeno je u bilo kojem području na kojem su divlje svinje zaražene ASK-om.

U odnosu na životinje, razlikuje se sljedećih pet kategorija divljih svinja, čija je epidemiološka uloga u širenju bolesti različita:

Prijemljiva: zdrava jedinka koja nikada nije bila zaražena virusom ASK-a i stoga je prijemljiva na virus. Takve životinje obično čine najveći dio populacije. Broj prijemljivih životinja sezonski se mijenja zbog reprodukcije i smrtnosti (uglavnom zbog lova, ali također i zbog predacije, smrti od gladovanja i bolesti). Životinje koje su bile inficirane virusom ASK i preživjele su infekciju uz nastanak protutijela mogu ponovno biti inficirane drugim, pa i istim sojem virusa ASK;

U inkubaciji: jedinka koja je zaražena, ali još uvijek ne pokazuje vidljive kliničke znakove bolesti. Životinja u kojoj se virus inkubira mogla bi širiti virus nekoliko dana (obično 2) prije nego što se pokažu očiti znakovi bolesti. Broj životinja u kojima se virus inkubira obično je vrlo malen (očekivano <2%) i ovisi o fazi invazije virusa, sezonskim i drugim čimbenicima. Jedini način da se sazna je li divlja svinja koju u fazi inkubacije jest prikupljanje uzoraka i pretraživanje u laboratoriju, a isto se provodi u područjima oko zaraženih područja;

Oboljela: divlja svinja koja pokazuje kliničke znakove. Uobičajeno je da divlje svinje pokazuju kliničke znakove 3-5 dana prije smrti; 90-95% oboljelih životinja ugiba (Pietschmann i sur., 2015.). Klinički znakovi nisu patognomonični, a uglavnom se javljaju kao bilo koji od mogućih abnormalnih ponašanja (nedostatak bijega, drhtanje stražnjih nogu, malaksalost itd.) koji ukazuju tek na to da je divlja svinja bolesna. Udio bolesnih životinja u populaciji može biti nedovoljno zastupljen u odstrjelu. To se događa zato što ponašanje bolesnih životinja može odstupati od ponašanja normalnih životinja, a životinje mijenjaju svoje dnevne rutine, gube apetit i prelaze na nedostupne dijelove svog teritorija itd. Samo laboratorijsko pretraživanje može potvrditi je li bolesna divlja svinja zaražena virusom ASK ili drugim patogenom. Veća je vjerojatnost da će automobili udariti bolesne životinje, a također je vjerojatno da su podložnije predaciji. Zbog toga se treba na ASK pretražiti svaka divlja svinja usmrćena u prometu te svaka koja pokazuje znakove bolesti ili neuobičajenog ponašanja;

Seropozitivna: životinje koje su preživjele bolest i razvile protutijela za ASK virus (obično oko 0,5-2%). ASK protutijela ne neutraliziraju virus, pa su seropozitivne životinje još uvijek prijemljive na zarazu, čak i ako fenologija virusa u tim životinjama nije poznata (količina virusa koji se umnožio i izlučio, trajanje zaraznog razdoblja itd.). Nema dokaza da su seropozitivne životinje koje su preživjele zarazu virusom ASK genotipa II značajne za dugotrajno širenje virusa (Petrov i sur., 2018.). Međutim, ustanovaljeno je da virus može preživjeti u limfnim čvorovima seropozitivnih životinja (EFSA, 2010.), stoga se seropozitivne svinje smatraju jedinkama pozitivnima na virus;

Uginula: većina divljih svinja zaraženih virusom ASK-a ugiba (90-95%), a njihove lešine ostaju u okolišu duže vrijeme, što predstavlja važan izvor zaraze zdravih jedinki iste vrste. Otkrivanje lešina od strane lovaca ili drugih ljudi koji posjećuju staništa divljih svinja najčešći je način otkrivanja bolesti na područjima na kojima se ASK nije pojavila. Svaka uginula

divlja svinja treba biti uklonjena iz šume i uništena, a također treba provesti ispitivanja prisutnosti virusa ASK-a ili drugih patogena. Iako u bilo kojoj populaciji divljih svinja uvijek postoji udio životinja koje prirodno ugibaju (Keuling i sur., 2013.), u slučaju ASK-a, broj lešina bi se znatno povećavao, što bi ukazivalo na unos virusa ili epidemiju koja je u tijeku. U Europi, očevidna učestalost otkrivanja lešina zaraženih ASK-om povećava se tijekom zime i kasnog proljeća - ranog ljeta, dok udio zaraženih životinja (i lešina) doseže svoj vrhunac uglavnom tijekom srpnja i kolovoza. To odražava neke obrasce ciklusa prijenosa bolesti i dinamiku populacije, kao i kumulativni učinak klimatskih i sezonskih čimbenika na razgradnju lešina i vjerovatnost njihovog otkrivanja od strane ljudi.

3. PUTEVI I MEHANIZMI ZARAZE

Izravni horizontalni prijenos

Uobičajeni fizički kontakti između divljih svinja u istoj skupini, i povremeni kontakti s jedinkama iz drugih skupina, pružaju dovoljno mogućnosti za prijenos virusa između zaražene i prijempljive jedinke, kao što se događa u slučaju mnogih drugih zaraznih bolesti životinja. Izravni horizontalni prijenos ima vrlo važnu ulogu u slučaju relativno visoke gustoće populacije divljih svinja, kao što je, primjerice, slučaj kada se virus po prvi puta pojavi u populaciji koja je bila zdrava.

Lokalni neizravni prijenos kontaminiranim okolišem

Staništa zaražene populacije divljih svinja mogu biti izrazito kontaminirana izlučevinama bolesnih životinja (urin, fekalije), ostacima životinja koje su uginule od zaraze (cijele lešine ili njihovi dijelovi koje prenose strvinari) i zaraženim materijalima koji potječu od lova na životinje koje su pozitivne na ASK (krv, meso, iznutrice) koji su ostavljeni ili izravno odloženi u staništa. Ovisno o dobu godine, vremenski i drugi mehanizmi čimbenika prijenosa u okoliš mogu biti više ili manje učinkoviti.

a) **Izlučevine i ostaci zaraženih životinja** - Virus izlučen urinom i fekalijama kontaminira staništa divljih svinja, a tijekom povoljnih razdoblja (zima, niske temperature) može se prenijeti na druge prijempljive životinje. Iznutrice koje su ostavljene od strane lovaca prilikom evisceracije zaraženih životinja na lovištu igraju važnu ulogu te povećavaju količinu virusa u okolišu. Velika je vjerovatnost da će prijempljiva divlja svinja koja živi u kontaminiranom staništu doći u kontakt sa zaraznom dozom virusa. U blizini hranilišta divljih svinja, kontaminacija okoliša mogla bi biti još važnija. Zimi, uz redovnu dopunska hranidbu, divlje svinje pokazuju sklonost smanjivanja svojeg životnog područja, te se kreću tek unutar 200-300 metara od mjesta hranjenja. Uz povećanu vjerovatnost susreta s drugim jedinkama i posljedične zaraze putem izravnog kontakta (vidi: 1. Izravni horizontalni prijenos), ovo također čini neizravni prijenos virusa vjerovatnjim.

b) **Zaražene lešine** - neizravni prijenos putem zaraženih lešina divljih svinja (ili domaćih svinja) smatra se ključnim u epidemiologiji ASK-a. Zarazne lešine mogu održavati živi virus u staništu tijekom dužeg vremenskog razdoblja u odnosu na izlučevine i iznutrice (mjeseci), naročito tijekom zime, čime se dovodi do toga da gustoća populacije divljih svinja i stopa kontakata nisu relevantni za dugoročno održavanje ciklusa prijenosa ASK-a. Također mogu privlačiti i druge životinje, osobito ljeti, nakon što lešine prođu prve faze raspadanja i počnu pružati dobre uvjete za razvoj mnogobrojnih zajednica insekata.

Zaključeno je da je brzo otkrivanje i uklanjanje (ili sigurno uništenje i dekontaminacija na licu mjesta) lešina učinkovita mjera kontrole prijenosa ASKV-a u populaciji divljih

svinja. Čak i ako je lešina otkrivena i uklonjena nekoliko dana nakon smrti životinje, kasno uklanjanje može i dalje biti učinkovita kontrolna mjera.

Neizravni prijenos na velike udaljenosti koji uključuje ljude

Ljudi mogu prenosi kontaminirano meso i druge sekundarne proizvode (kože, lubanje, kljove ili druge trofeje itd.) na velike udaljenosti. Bez obzira na to potjeće li virus od domaćih svinja ili divljih svinja, ovi mehanizmi pružaju sredstva (najčešće nenamjerno i slučajno) širenja bolesti na udaljenosti koje su znatno veće od onih koje su uključene u gore opisane mehanizme prijenosa. Ispuštanje virusa putem kontaminiranih materijala od strane ljudi osobito je opasno jer se bolest može rasplamsati u najmanje očekivanom području, vrlo daleko od poznatih izbijanja kod domaćih svinja ili divljih svinja. Bilo je mnogo situacija, uključujući i one u Europi, kada je neizravno širenje virusa preko velikih udaljenosti iniciralo nove izolirane skupine zaraze divljih svinja (i domaćih svinja), od kojih su se neke razvile u dugotrajne epidemije. Najnoviji primjeri uloge koju neizravni prijenos na velike udaljenosti može imati u zemljopisnoj ekspanziji bolesti su lokalizirane epidemije ASK-a u Češkoj, Mađarskoj i Belgiji.

Zaraza domaćih svinja

Domaće svinje zaraze se uglavnom izravnim ili neizravnim kontaktom s virusom. Smatra se da je zaražena divlja svinja glavni izvor zaraze domaćih svinja, a svi prethodno navedeni putovi i mehanizmi širenja istovjetni su i u populaciji domaćih svinja.

Jedina učinkovita mjera za sprječavanje unosa virusa ASK u uzgoje domaćih svinja je visoka razina biosigurnosti koja se mora provoditi kontinuirano i održavati na visokoj razini.

4. LANAC PRIJENOSA U POPULACIJI DIVLJIH SVINJA

Kada se virus pojavi u populaciji divljih svinja u kojoj do tada nije bilo zaraze, vjerojatno će se pojaviti epidemija. Što je učinkovitije širenje virusa, to prije dovodi do relativno bržeg opadanja populacije divljih svinja. Ako se takva pogodjena populacija istovremeno lovi (isključivo pod kontrolom u sanitarno svrhe), smanjenje broja divljih svinja može postati još brže. Kao rezultat smanjenja populacije, broj kontakata između različitih vrsta također se smanjuje, a epidemija se pretvara u fazu endemije. Na razini lovišta, često se primjećuje povlačenje virusa, ali ponovno pojavljivanje u nekoliko mjeseci nakon toga uobičajena je pojava. Divlje svinje koje su se kretale na zaraženom području i bile u doticaju s "neaktivnim" virusom u zaraznim lešinama divljih svinja vjerojatno će utjecati na ponovno pojavljivanje. Iako virus ima tendenciju da ostane endemičan u prethodno zaraženim područjima (uglavnom zbog zaraženih lešina), također se širi, izravnim kontaktom, na još nezaražene susjedne skupine divljih svinja.

Stoga je epidemiološki ciklus ASK-a kod divljih svinja karakteriziran kombinacijom lokalne, endemične postojanosti uz istodobno stabilno zemljopisno širenje na susjedna područja bez bolesti. Izračuni pokazuju da se prirodno zemljopisno širenje ASK-a u populaciji divljih svinja s gustoćom tipičnom za sjevernu i istočnu Europu odvija brzinom od oko 1-2 km mjesечно, što rezultira ekspanzijom zone endemije od 12-25 km u jednoj godini (EFSA, 2017.), iako su uočene razlike među zaraženim područjima, a razlike su vjerojatno određene različitim lokalnim gustoćama populacija divljih svinja, vremenom unosa, vrstama intervencija i aktivnostima gospodarenja.

U takvom okviru, izravni prijenos virusa sa životinje na životinju prevladava na početku zaraze, a nakon smanjenja populacije divljih svinja neizravni način prijenosa - putem zaraznih lešina i/ili kontaminiranih staništa, postaje sve važniji za lokalno održavanje zaraze.

Intenziviranje izravnog prijenosa također se može epizodno pojaviti nakon sezone parenja kada je populacija domaćina gotovo udvostručena, a novorođene jedinke (2-6 mjeseci) istražuju stanište, što povećava kontakte između različitih vrsta, kao i pri regrupiranju ili skupljanju (npr. na poljima kukuruza i slično) čopora.

Dinamika ASK-a kod divljih svinja također je obilježena povremenim epizodama širenja virusa na duge udaljenosti izvan normalnog područja kretanja divljih svinja. Unatoč nekim vrlo povremenim kretanjima na velike udaljenosti (tj. približno 100 km u 6 mjeseci: Jerina i sur., 2014.), divlje svinje uglavnom su sedentarna vrsta (Podgórski i sur., 2013.) sa stabilnim grupnim životnim područjima koji rijetko nadilaze 50 četvornih km. Moguće kretanje većeg opsega tijekom kojih bi zaražena (faze inkubacije + faza bolesti) životinja mogla širiti virus (npr. mladi mužjaci tijekom razdoblja disperzije ili odrasli mužjaci u potrazi za ženkama u estrusu) trajat će samo nekoliko dana (5-7). Tijekom jednog tjedna, vrlo je malo vjerojatno da će divlja svinja (osobito kada je neometana i bolesna) prijeći velike udaljenosti. Dakle, prijenosi ASK-a na velike udaljenosti očito su uzrokovani ljudskim aktivnostima, ali njihova nemamjerna ili nezakonita narav (često zbog nedostatnog znanja o izvorima virusa i njegovim mehanizmima prijenosa) otežava dokazivanje istoga dostatnim epidemiološkim dokazima.

Opisani epidemiološki uzorak često je dodatno zakompliciran drugim čimbenicima, uključujući ulogu lovačkih aktivnosti (lov pogonom, prisustvo ljudi na mjestima hranidbe, odlaganje kontaminiranih iznutrica, prisustvo predmeta koji mogu prenositi virus) u povećanju širenja virusa; prisutnost lokalno zaraženih domaćih svinja (u slobodnom uzgoju ili leštine koje su nezakonito odložene u okolišu) u kontaktu s divljim svinjama itd.

5. GLAVNE ZNAČAJKE ASK, ŠIRENJA ZARAZE I MJERA KOJE SE PROVODE

- ASK virus preživljava u populaciji divljih svinja koja živi u sjeveroistočnoj Europi bez ikakvog doprinosa od domaćih svinja ili krpelja.
- ASK virus izrazito je otporan u bilo kojem matriksu, a niske temperature povećavaju njegovo preživljavanje.
- Zaraza se širi kako izravnim tako i neizravnim kontaktima. Leštine zaraženih divljih svinja održavaju virus na životu tijekom dugog razdoblja, posebice zimi, što omogućava neizravni prijenos prilikom kontakta s prijeljivom divljom svinjom.
- Zbog epidemiološke uloge leština, jednostavno mehaničko smanjivanje veličine populacije divlje svinje od sporedne je vrijednosti ako leštine nisu uklonjene i zbrinute na siguran način; prisutnost zaraženih leština omogućava postojanost virusa čak i kada se zaražena populacija divljih svinja održava na iznimno maloj gustoći. Iako nema divljih svinja, virus je još uvijek u okolišu.
- Neprecizne procjene veličine i gustoće populacije divljih svinja, uz nedostatak znanja o glavnim epidemiološkim parametrima ciklusa prijenosa, sprječavaju bilo kakvu procjenu mogućeg praga gustoće za nestanak zaraze i kritične veličine populacije divljih svinja koja je potrebna za moduliranje dinamike bolesti.
- Depopulacijski pristup u populaciji divljih svinja osigurava sljedeće:
 - Unos virusa može se izbjegići jedino putem intervencija i preventivnih mjer koje se provode na izvorišnoj populaciji, a nikada na populaciji koja je u početnoj fazi zaraze

- Unos te daljnje širenje može biti spriječeno ili minimizirano održavanjem gustoće populacije divljih svinja na najnižoj mogućoj vrijednosti, ali jedino prije nego što se dogodilo unos virusa
- Tijekom faze epidemije, mogućnosti za iskorjenjivanje bolesti su male (ako uopće postoje) zbog velikog broja prisutnih zaraženih divljih svinja, a rizik od provedbe mjera iskorjenjivanja zbog poticanja daljnog zemljopisnog širenja virusa je velik.
- Tijekom faze endemije, postoji određena vjerojatnost iskorjenjivanja zaraze ako i kada populacija domaćina (divljih svinja) bude smanjena što je više moguće, uz uklanjanje lešina u sklopu primjene strogih mjera biosigurnosti.
- Trajno pasivno nadziranje glavni je alat za razumijevanje evolucije bolesti (tj. identifikaciju navedenih faza, zemljopisnog širenja i dr.).

6. PRAVNA I ZNANSTVENA OSNOVA

- Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/13, 148/13 i 115/18)
- Naredba o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 28/21)
- Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (Narodne novine, broj 115/18, 98/20)
- Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju za tekuću godinu
- Pravilnik o prijavi bolesti životinja (Narodne novine, broj 65/20)
- Pravilnik o mjerama kontrole afričke svinjske kuge (Narodne novine, broj 112/07)*
- Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za afričku svinjsku kugu (Narodne novine, broj 116/08)*
- Provedbena Odluka Komisije o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama 2014/709/EU**
- Nacionalni krizni plan za ASK
- Priručnik o afričkoj svinjskoj kugi kod divljih svinja i biosigurnosti tijekom lova (Stalna skupina stručnjaka za afričku svinjsku kugu u Europi u okviru GF-TAD-a)
- www.oie.int
- https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

* 21. travnja 2021. godine na snagu stupa izravno primjenjiva Uredba o zdravlju životinja 2016/429 i s njom povezane delegirane i provedbene uredbe kojima se ovi akti stavljaju van snage

** Predmetnu Odluku, 21. travnja 2021. godine zamijeniti će nova Provedbena Uredba o posebnim mjerama kontrole ASK

7. NADLEŽNA TIJELA I ORGANIZACIJE UKLJUČENE U PROVEDU PROGRAMA

Tijelo nadležno za organizaciju i koordinaciju provedbe ovoga Programa te izvješćivanje je Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Uzorkovanje i dostavu uzoraka provode nadležne ovlaštene veterinarske organizacije te u određenim slučajevima djelatnici Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI).

Nacionalni referentni laboratorij za dijagnostiku ASK je HVI u Zagrebu, Savska cesta 143.

Nadzor nad provedbom mjera propisanih ovim Programom provode veterinarni inspektorji Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

8. CILJEVI I PROVEDBA PROGRAMA

Ciljevi Programa su:

- rano otkrivanje unosa virusa ASK u svrhu pravovremene i žurne provedbe mjera radi sprječavanja daljnog širenja
- održavanje statusa zemlje slobodne od ASK.

Provedba Programa tijekom 2019. godine

Tijekom 2019. godine ukupno je metodom QRT-PCR na prisutnost virusa ASK pretraženo 4.250 uzoraka podrijetlom od domaćih svinja te 3.177 uzoraka podrijetlom od divljih svinja.

Provedba pasivnog nadziranja u divljih i domaćih svinja značajno je doprinijela ispunjenju ciljeva Programa nadziranja ASK u 2019. godini. Pokazatelj pozitivnog učinka kampanje podizanja svijesti o ASK je i značajno veći broj uzoraka podrijetlom od uginulih divljih svinja koji je višestruko povećan. U 2019. godini pretraženo je 75 uzorka podrijetlom od uginulih divljih svinja i to s područja 18 županija. Uginule divlje svinje nisu bile prijavljene tijekom 2019. godine samo na području 3 županije i to Ličko-senjskoj, Međimurskoj i Karlovačkoj županiji.

Provedba Programa tijekom 2020. godine

Tijekom 2020. godine ukupno je metodom QRT-PCR na prisutnost virusa ASK pretraženo 9.400 uzoraka podrijetlom od domaćih svinja te 3.699 uzoraka podrijetlom od divljih svinja.

Sumnja na ASK bila je postavljena na pet gospodarstava od čega su na dva gospodarstva utvrđeni klinički znakovi, a na preostala tri povećana ugušuća svinja.

Provedba pasivnog nadziranja u divljih i domaćih svinja značajno je doprinijela ispunjenju ciljeva Programa nadziranja ASK u 2020. godini. Broj uzoraka podrijetlom od uginulih divljih svinja je nešto smanjen u odnosu na prethodno razdoblje te je pretraženo 68 uzorka podrijetlom od uginulih divljih svinja. Pasivno nadziranje u divljih svinja potrebno je dodatno ojačati budući veći broj uzoraka pridonosi višoj razini pouzdanosti u rezultate nadziranja.

Svi pretraženi uzorci polučili su negativan rezultat te se Republika Hrvatska i dalje smatra državom slobodnom od ASK.

Provedba Programa tijekom 2021. godine

Program obuhvaća sva gospodarstva na kojima se drže svinje te populacija divljih svinja na čitavom području RH i sastoji se od sljedećih komponenti:

Glavna komponenta Programa je pasivno nadziranje domaćih i divljih svinja koje se provodi kontinuirano na čitavom području RH u populaciji divljih i domaćih svinja:

- Pasivno nadziranje uključuje obavezno isključivanje ASK u slučajevima uginuća domaćih i divljih svinja te prijavu sumnje na ASK u slučaju utvrđenih kliničkih ili patoanatomske znakova ili u slučaju kada epidemiološki podaci ukazuju na moguću sumnju na ASK.

Aktivno nadziranje ASK koje se provodi isključivo u populaciji divljih svinja:

- Aktivno nadziranje ASK uključuje laboratorijsko pretraživanje na ASK zdravih odstranjeljenih divljih svinja.

Veterinarski pregledi gospodarstava koji se provode jednom godišnje na svim gospodarstvima koja drže svinje na otvorenom:

- U svrhu podizanja svijesti posjednika svinja o ASK i osiguravanja održavanja visokih mjera biosigurnosti na gospodarstvima koja drže svinje na otvorenom, jednom tijekom 2021. godine provoditi će se veterinarski pregled koji drže svinje na otvorenom u svrhu provjere biosigurnosnih uvjeta, odnosno revizije kategorizacije.

1. Pasivno nadziranje ASK

Obavezno je isključivanje ASK virusološkom pretragom organa te iznimno krvi* i to:

- u svake uginule divlje svinje (uključujući i divlje svinje stradale u prometu)
 - u uginulih domaćih svinja kako slijedi:
 - gospodarstva s brojem svinja većim od 100 - pretraživanje uginulih domaćih svinja (redovni mortalitet) provodi se najmanje jednom tjedno i to tako da se svaki tjedan obavezno na pretragu dostave najmanje prve dvije uginule svinje po svakoj proizvodnoj (epidemiološkoj) jedinici; ukoliko se na gospodarstvu drže krmače, na pretragu je poželjno dostavljati uginule svinje starije od 4 mjeseca, ukoliko su dostupne, a ne prasad mlađih dobnih kategorija
 - gospodarstva s brojem svinja manjim od 100 - pretražuje se svaka uginula domaća svinja starija od 4 mjeseca
 - pobačaji – na pretragu se dostavlja pobačeni fetus i/ili posteljica te
- *iznimno ako nije dostupan odgovarajući materijal, krv krmače koja je pobacila (krv se obavezno uzima u epruvetu s antikoagulansom)
- u svake svinje kod koje se isključuje klasična svinjska kuga (KSK) sukladno Programu nadziranja KSK u domaćih i divljih svinja
 - *u slučaju kad se radi o svinji s kliničkim znakovima, uzima se krv za virusološku pretragu (krv se obavezno uzima u epruvetu s antikoagulansom).

U svim slučajevima kada se utvrde klinički znakovi ili patoanatomske promjene ili epidemiološki pokazatelji koji upućuju na ASK, obavezna je prijava sumnje na ASK i postupanje u skladu s Pravilnikom o načinu praćenja, prijavni i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja te se na sumnjivom gospodarstvu provode mjere iz članka 4. stavka 3. Pravilnika o mjerama kontrole afričke svinjske kuge.

Odgovarajući klinički pregledi, uzorkovanje i laboratorijske pretrage, kako bi se u slučaju sumnje potvrdila odnosno isključila ASK, provode se u skladu sa smjernicama i postupcima utvrđenim Pravilnikom o dijagnostičkom priručniku za afričku svinjsku kugu (Poglavlje IV).

2. Aktivno nadziranje ASK

Aktivno nadziranje obuhvaća virusološko pretragu krvi i/ili organa odstrijeljenih divljih svinja.

Aktivno nadziranje ASK biti će provedeno u populaciji divljih svinja u visoko rizičnom području. U tu svrhu određena su zemljopisna područja, odnosno područja lovišta smještena uz granicu s Republikom Srbijom i Bosnom i Hercegovinom u kojima će se provoditi uzorkovanje svih odstrijeljenih divljih svinja.

Lovišta u kojima se provodi aktivno nadziranje navedena su u popisu u Dodatku I ovoga Programa.

Uzorci se uzimaju od **svake odstrijeljene divlje svinje** i to **uzorak slezene** u količini organa površine 3x3 cm.

Istovremeno se od svake odstrijeljene divlje svinje uzimaju uzorci krvi za serološku pretragu na KSK sukladno Programu nadziranja KSK u divljih svinja u 2021./2022. godini (KLASA: 322-02/20-01/57).

3. Veterinarski pregledi gospodarstava koja drže svinje na otvorenom

Veterinarski pregledi gospodarstava koja drže svinje na otvorenom provode se na svim gospodarstvima na kojima je tijekom prethodne kategorizacije utvrđeno da drže svinje na otvorenom (na pitanje O6.17. odgovoreno s „DA“). Prema podacima od 17. prosinca 2020. godine takvih gospodarstava ima 428 (popis u Dodatku II).

Od tog broja, samo je 127 gospodarstava kategorije 4 – gospodarstva koja drže svinje na otvorenom, imaju odobrenje veterinarske inspekcije i udovoljavaju svim uvjetima biosigurnosti sukladno broju svinja.

Budući je ova skupina svinja posebno rizična u odnosu na ASK potrebno je kontinuirano održavati visoku razinu biosigurnosti na što se može pozitivno utjecati redovitim pregledima i edukacijom posjednika.

Ovlaštene veterinarske organizacije dužne su sukladno području nadležnosti provesti preglede takvih gospodarstava u razdoblju **od 1. svibnja do 30. srpnja 2021. godine**.

Pregledi se provode u skladu s Uputom o provedbi kategorizacije (KLASA: 322-02/18-01/61), (u dalnjem tekstu: Uputa) te se unose u bazu podataka VETIs – Kategorizacija-biosigurnost.

Posebna pažnja treba se posvetiti pitanjima o zdravlju životinja u području E. ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I BIOSIGURNOST:

- prijavljuje li posjednik veterinaru svaku sumnju, znakove bolesti i uginuće
- provode li se mjere propisane godišnjom naredbom
- jesu li pobačaji prijavljeni
- je li bilo uginuća u posljednja 3 mjeseca.

U skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem i odgovorima unesenim u bazu podataka, sustav određuje novu kategoriju gospodarstva. Ukoliko je gospodarstvo zbog određenih nesukladnosti kategorizirano u kategoriju 1, primjenjuju se odredbe Naredbe o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj u smislu obaveznih kliničkih pregleda prije premještanja ili klanja svinja za vlastite potrebe.

Za gospodarstava koja imaju odobrenje veterinarske inspekcije za držanje svinja na otvorenom, obavezno je u rubriku X6.18. unijeti odgovor „DA“ i upisati *klasu* i *urbroj* izdanog odobrenja.

Gospodarstva koja takvo odobrenje nemaju obavezno je pismenim putem prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji na obrascu iz Dodatka II Upute.

Ovlaštene veterinarske organizacije imaju pravo na naknadu za provedene preglede isključivo ukoliko su uneseni svi traženi podaci.

9. UZORKOVANJE, LABORATORIJSKO PRETRAŽIVANJE I DOSTAVA LEŠINA

Ovlašteni veterinar dužan je osigurati da uzorci svinja budu brzo i na odgovarajući način dostavljeni u dijagnostički laboratorij, što uključuje najmanje poštivanje sljedećih smjernica:

- 1) Krv se uzima u sterilne epruvete. Dovoljno je uzeti oko 5 ml krvi (gornji rub uzete krvi mora biti oko 2 cm ispod donjeg ruba čepa epruvete).
- 2) Krv za virusološku pretragu uzima se u epruvetu s antikoagulansom.
- 3) Nakon uzimanja krvi, epruvete se moraju dobro začepiti (po mogućnosti čep dodatno izvana oblijepiti ljepljivom trakom) i obilježiti brojem Obrasca za uzorkovanje (za domaće svinje ispisuje se iz sustava VETIs - KSK/ASK) na kojemu su navedeni podaci o svinji od koje je uzeta krv.
- 4) Svaka epruveta se mora omotati u upijajući materijal (upijajući celulozni papir ili staničevinu) i uložiti u nepropusnu posudu na način da se spriječi proljevanje uzorka.
- 5) Uzimanje odgovarajućih organa domaćih svinja za virološku pretragu obavlja se na farmi isključivo uz pridržavanje svih biosigurnosnih mjera i na odgovarajućem mjestu koje je izdvojeno od objekata sa živim svinjama, a najbolje na lokaciji s koje se lešine odvoze na neškodljivo uklanjanje.
- 6) Od lešina domaćih i divljih svinja uzima se uzorak slezene (i/ili bubrega), u količini organa površine 3x3 cm. Kad je moguće, mogu se uzeti i tonzile koje se dostavljaju čitave. Uzorak organa mora se upakirati u manje sterilne kutijice (plastične). Daljnji postupak s uzorkom (označavanje, pakiranje i pohrana) jednak je postupanju s uzorcima krvi.
- 7) Kada je lešina divlje svinje pronađena od strane lovoovlaštenika, odgovorna osoba lovoovlaštenika obavještava nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju s kojom se dogovara lokacija prikladna za uzorkovanje i neškodljivo uklanjanje lešine; lokacija uzorkovanja lešine može biti u blizini lovačkog doma, uz prilaznu cestu, lokacija veterinarske organizacije ili bilo koja druga lokacija koja osigurava najbržu i najsigurniju dostavu lešine do veterinara koji provodi uzorkovanje; prilikom manipulacije lešinama obavezno je pridržavanje najstrožih biosigurnosnih mjera (obavezna dezinfekcija) kako bi se mogućnost širenja virusa svela na najmanju moguću mjeru.

- 8) Uzorkovanje lešina divljih svinja provodi ovlaštena veterinarska organizacija na mjestu nalaska lešine odnosno na mjestu dostave od strane lovoovlaštenika.
- 9) U slučajevima kada uzorkovanje iz točke 8. ovoga Dijela nije moguće, ovlašteni veterinar upućuje lešinu divlje svinje u najbliži objekt za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 1 ili sabiralište nusproizvoda životinjskog podrijetla Kategorije 1 uz popratni Obrazac iz točke 15. ovoga Dijela na kojem obavezno treba navesti lokaciju na kojoj je nađena lešina i ime i prezime osobe koja je pronašla, odnosno prijavila pronalazak lešine. O upućivanju lešine divlje svinje na objekt/sabiralište potrebno je obavijestiti ovlaštenu veterinarsku organizaciju nadležnu na objektu/sabiralištu sukladno točki 12. ovoga Dijela.
- 10) Kad je lešina divlje svinje nađena na području lovišta, nakon uzorkovanja se zbrinjava u skladu s Planom biosigurnosti za predmetno lovište.
- 11) Ako je lešina pronađena izvan područja lovišta (npr. javna površina, uz prometnicu i sl.), ovlaštena veterinarska organizacija dužna je kontaktirati ovlaštenog sakupljača nusproizvoda za predmetnu jedinicu lokalne samouprave, odnosno pravnu osobu koja je nadležna za područje na kojem je pronađena lešina u svrhu zbrinjavanja lešine nakon provedenog uzorkovanja.
- 12) Ukoliko je lešina divlje svinje dopremljena na objekt/sabiralište, uzorkovanje provodi nadležna ovlaštena veterinarska organizacija za taj objekt, odnosno sabiralište:
- HR04-004NP Agroproteinka d.d., Sesvete, Grad Zagreb – **Veterinarska stanica Sesvete; kontakt telefon: 01/2000 191**
 - HR01-007NP Agroproteinka d.d., Garčin, Brodsko-posavska županija – **Veterinarska ambulanta Trnjani; kontakt telefon: 035/422 026**
 - HR01-019NP Agroproteinka d.d., Grubišno Polje, Bjelovarsko-bilogorska županija - **Veterinarska ambulanta Mali Zdenci; kontakt telefon: 043/427 230**
 - HR01-013NP Agroproteinka d.d., Beram, Pazin, Istarska županija - **Veterinarska stanica Pazin; kontakt telefon: 052/624 410**
 - HR01-010NP Agroproteinka d.d., Biljane Gornje, Zadarska županija - **Veterinarska ambulanta Benkovac d.o.o.; kontakt telefon: 023/681 171**
- 13) U slučajevima kada je lešina divlje svinje u poodmakloj fazi razgradnje dostavlja se uzorak kosti (sternum, rebra ili kosti nogu) koja se čini najmanje oštećenom, a u slučaju da nije moguće identificirati dio lešine, potrebno je prije slanja kontaktirati Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane pozivom na kontakte navedene na kraju ovoga Programa.
- 14) Svaki uzorak podrijetlom od domaćih svinja (uključujući i lešine) mora pratiti Obrazac ispisan iz aplikacije VETIs: *Testiranje na KSK/ASK*; unos podataka te ispis obrazaca provodi se u skladu s korisničkim uputama; posebno je važno upisati odgovarajuće podatke za svrhu uzorkovanja, a u slučaju sumnje na ASK obavezna je dostava Obrasca za prijavu sumnje na ASK sukladno odredbama iz Dijela 8. točke 1. ovoga Programa.
- 15) Svaki uzorak podrijetlom od divljih svinja (uključujući i lešine) mora pratiti Obrazac za dostavu uzoraka odstrijeljenih divljih svinja ili lešina divljih svinja na laboratorijsko pretraživanje na klasičnu/afričku svinjsku kugu (Dodatak II ovoga Programa); u tu svrhu lovoovlaštenicima koji su uključeni u aktivno nadziranje divljih svinja biti će dostavljeni obrasci i oprema za uzrokovanje, dok će za sva ostala lovišta u kojima se provodi samo pasivno nadziranje, kao i za slučajeve pronalaska uginulih divljih svinja izvan područja lovišta, predmetne Obrasce ispunjavati ovlaštene

veterinarske organizacije, **u tu svrhu će svakoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji biti dostavljeno po pet obrazaca i opreme za uzorkovanje**; u slučaju da tijekom provedbe ovoga programa ovlaštene veterinarske organizacije imaju potrebu za dodatnim obrascima i opremom, isto se može naručiti u Hrvatskom veterinarskom institutu, Savska cesta 143, 10000 Zagreb na kontakte: tel. 01/6123-600, e-mail: ured@veinst.hr.

- 16) U slučajevima kada uzorkovanje od uginulih divljih svinja provodi nadležna veterinarska organizacija na objektu/sabiralištu, potrebno je dodatno ispuniti Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje ("Labnar" Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje iz Dodatka II godišnje Naredbe) te zajedno s uzorcima i Obrascem iz točke 15. ovoga Dijela uputiti u laboratorij.
- 17) Uzete uzorke i popratne Obrasce, ovlašteni veterinar treba što je prije moguće poslati u laboratorij, a do slanja, uzorke krvi i organe treba držati na temperaturi hladnjaka, od 4° do 8° C (uzorci krvi se nikako ne smiju smrznuti); iznimno ukoliko drugačije nije moguće, uzorke organa je dozvoljeno smrznuti te neodmrznute, pothlađene, dostaviti laboratoriju.
- 18) **NAPOMENA:** u slučaju uzimanja uzoraka krvi u svrhu provedbe serološke pretrage (isključivo po uputi Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane) u epruvetu s uzorkom krvi ne smije se staviti antikoagulans.
- 19) Uzorci podrijetlom od divljih i domaćih svinja dostavljaju se u laboratorij za virologiju **Hrvatskog veterinarskog instituta, Zagreb, Savska cesta 143.**
- 20) Na svakom pakovanju u kojem se uzorci dostavljaju u laboratorij, mora biti čitko naznačena točna adresa laboratorija koji prima materijal, adresa pošiljatelja, te napomena „životinjski patološki materijal; pokvarljivo; lomljivo; ne otvarati do dospijeća u laboratorij za ASK“.
- 21) Tijekom dostave/prijevoza uzoraka u ovlašteni laboratorij mora se pridržavati i drugih odredbi iz Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za ASK (Narodne novine, br. 116/08).
- 22) Za dodatna pojašnjenja u vezi uzorkovanja i/ili dostave uzoraka na pretragu, ovlašteni veterinar koji će obavljati uzorkovanje u okviru ovoga Programa, može kontaktirati HVI, Odjel za virologiju, NRL za ASK na tel: 01/6123 645 ili putem e-mail-a na adresu: jemersic@veinst.hr.
- 23) **Iznimno, u slučaju postavljanja sumnje kada se utvrde klinički znakovi ili patoanatomske promjene koje upućuju na ASK, uz obveznu prijavu sumnje, lešine domaćih i divljih svinja dostavljaju se izravno u Hrvatski veterinarski institut Zagreb, Savska cesta 143, uz popratne obrasce kako je navedeno u odredbama ovoga Dijela Programa.**
- 24) **NAPOMENA:** sve odredbe za postupanje oko prijave, uzorkovanja i zbrinjavanja uginulih divljih svinja na jednaki način primjenjuju se i u slučaju pronalaska uginulih domaćih svinja izvan područja gospodarstva. O svakom takvom slučaju potrebno je obavijestiti nadležnog veterinarskog inspektora koji je dužan pokrenuti postupak protiv posjednika svinje ukoliko je na uginuloj domaćoj svinji vidljiva identifikacijska oznaka.

10. FINANCIRANJE

1. Troškovi uzimanja i dostave uzoraka u laboratorij te laboratorijskih pretraga pokrivaju se iz sredstava državnog proračuna.
2. Trošak zbrinjavanja lešina divljih svinja snosi:
 - lovoovlaštenik kada se lešine zbrinjavaju u skladu s Planom biosigurnosti za predmetno lovište
 - jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna osoba nadležna za područje na kojem je pronađena lešina kada je lokacija pronalaska uginule divlje svinje izvan područja lovišta
 - ovlaštena veterinarska organizacija, kada su lešine upućene od ovlaštenog veterinara izravno u sabiralište u svrhu uzorkovanja, za što ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji pripada naknada iz državnog proračuna u visini stvarnog iznosa plaćenog za zbrinjavanje lešine koja se isplaćuje istovremeno s naknadom iz točke 3. ovoga Dijela.
 - laboratorij, kada su lešine upućene od ovlaštenog veterinara izravno u laboratorij u svrhu uzorkovanja.
3. Za svaku pronađenu uginulu divlju svinju koja je prijavljena i od koje je uzet uzorak sukladno ovome Programu, isplaćuje se naknada u skladu s Naredbom i važećim cjenikom:
<http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/Troškovi%20u%20veterinrstvu/CIJENI%20PROSPANIH%20VETERINARSKIH%20USLUGA%20KOJE%20SE%20PODMIRUJU%20IZ%20SREDSTVA%20DRŽAVNOG%20PRORAČUNA%20REBU%20BLIKE%20HRVATSKE%20ZA%202021.%20GODINU.pdf>.
4. Naknada troškova ovlaštenim veterinarskim organizacijama osigurana je samo u slučajevima kada su uzorci uzeti i dostavljeni na način propisan ovim Programom.

Kontakt osoba Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane za provedbu ovoga Programa je

Žaklin Acinger-Rogić, dr.med.vet.

kontakt telefon 01/6443 839
mobitel 099/8156 254
e-mail: zaklin.acinger@mps.hr)

DOJAVA PRONALASKA UGINULIH DIVLJIH SVINJA

U radno vrijeme pozivom na broj telefona 01/6443 540 ili
slanjem poruke na e-mail: veterinarstvo@mps.hr

Izvan radnog vremena pozivom na:

DEŽURNI TELEFON

099/4392-507

DODATAK I
Popis lovišta u kojima se provodi aktivno nadziranje na ASK
/Dio 8., točka 2./

Žup.	BROJ I NAZIV LOVIŠTA	MF planirani	Planirani odstrel	LOVOVLAŠTENIK
SM	III/9 GREDE - KAMARE	234	355	HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ
	III/20 MAJDAN I	140	140	MAJDAN vl. NOVAK MIROSLAV
	III/24 ORLOVA	24	36	LU ŠLJUKA Glina
	III/29 PROLOM	150	225	AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
	III/36 VIŠNJIČKI BOK	96	120	OBRT KARLOVIĆ vl.Karlović Marijan
	III/38 MAJDAN II	100	75	LD JELEN Divuša
	III/40 ZRINSKA GORA II	140	210	ROSBAK d.o.o. Dvor
	III/117 JASENOVAC	28	42	LD PATAK Jasenovac
	III/122 HRVATSKA DUBICA	30	30	LD JELEN Hrvatska Dubica
	III/123 HRVATSKA KOSTAJNICA	72	90	LD NARETAK H Kostajnica
	III/124 DIVUŠA	44	55	LD JELEN Divuša
	III/132 GLINA II	30	38	LU ŠLJUKA Glina
KA	III/137 TOPUSKO	80	100	LD JELEN Topusko
	IV/4 CETINGRAD	32	40	BZ SLOVINJE Cetingrad
	IV/22 PETROVA GORA	100	75	HRVATSKE ŠUME d.o.o.
	IV/141 SLUNJ	30	23	LD Korana Slunj
	IV/143 BATNOGA	32	40	LD Kuna Cetingrad
	IV/144 CETINGRAD	30	38	LD Kuna Cetingrad
	IV/145 MAŠVINA	28	21	LD MEDVJED Rakovica
	IV/147 NOVA KRŠLJA	24	18	LD Golub Drežnik Grad
	IV/149 DREŽNIK GRAD	24	12	LD Golub Drežnik Grad
LS	IV/150 KUPLENSKO	50	62	JOSIP BEDEKOVIĆ d.o.o. Zagreb
	IX/26 PLJEŠIVICA	84	42	HRUŠKAR LOVSTVO d.o.o.
	IX/40 KAMENSKO	96	48	MUJANIĆ d.o.o. Korenica
	IX/41 BIJELI POTOICI	56	28	MUJANIĆ d.o.o. Korenica
	IX/122 Vaganac	30	23	LU Mala Kapela Plitvička Jezera
BP	IX/123 Donji Lapac	84	63	LD Ozeblin Donji Lapac
	XII/8 KRNAD	26	32	LU POSAVINA Davor
	XII/9 MEĐUSTRUGOVI	200	300	LU NAZIME Gredani
	XII/10 MIGALOVCI	50	62	LD MIG-95 Kaniža
	XII/14 PODLOŽJE - KLJUČEVI	60	90	LU PODLOŽJE - KLJUČEVI Nova Gradiška
	XII/16 RADINJE	88	132	HRVATSKE ŠUME d.o.o.
	XII/102 SIKIREVCI	4	4	LU GRANIČAR Sikirevci
	XII/104 SVILAJ	4	4	LU POSAVINA Svilaj
	XII/108 JELAS	16	12	LU JELAS Ruščica
	XII/113 BANOVCI	10	10	LU SRNA Banovci
ZD	XII/114 SLAVONSKI KOBAŠ	10	10	LD ORJAVA Slavonski Kobaš
	XIII/6 JELOVI TAVANI	90	45	LD VELEBIT Gračac
	XIII/133 Una	26	20	CUSTODIA d.o.o.

OB	XIV/9 PODUNAVLJE - PODRAVLJE	510	640	HRVATSKE ŠUME d.o.o.
	XIV/11 ŠARKANJ - VRBLJE	48	48	TROGA v.l. STIPAN ŠAŠLIN
	XIV/136 Dalj	9	10	LD Patka Dalj
	XIV/137 Erdut	21	22	LD Srnjak Erdut
	XIV/168 Batina	12	18	LD Fazan Batina
ŠK	XV/6 DINARA	60	45	LU DINARA Knin
	XV/8 PLAVNO	60	45	LU DINARA Knin
	XV/126 Cetina	24	12	LD Kijevo Kijevo
VS	XVI/1 DUGO CERJE - ČESTA - VOĆIN	38	40	LD GRAD ILOK Illok
	XVI/11 SPAČVA	480	600	HRVATSKE ŠUME d.o.o.
	XVI/13 STARI RAĐENOVCI	30	38	LU RAĐENOVCI-NUŠTAR Nuštar
	XVI/101 BREZOVICE	16	16	LU JASTREB Babina Greda
	XVI/102 DRENOVA	16	20	LU FAZAN Posavski Podgajci
	XVI/104 GAJ	12	12	LU GAJ Županja
	XVI/108 MAŠANJ	12	18	LU RIS Gunja
	XVI/110 POLOJ	10	13	LU JELEN Rajevo Selo
	XVI/111 RASTOVIĆ	4	4	LU SOKOL Štitar
	XVI/115 SITNATOVO	18	23	LU VEPAR Strošinci
	XVI/117 VJEROVI	24	30	LU VJEROVI Bošnjaci
	XVI/118 MARIKOVO - TOPOLOVAC	12	18	LU FAZAN Lipovac
	XVI/119 DUBOVICA	16	20	LU DUBOVICA Podgrađe
	XVI/121 DUBRAVA	9	13	LU DUBRAVA Nijemci
	XVI/125 PRIMA	4	6	LU ZEC Ilača
	XVI/126 BAJIN DOL	2	3	LU VEPAR Tovarnik
	XVI/127 BADNJARA	8	12	LU SOKOL LOVAS
SD	XVII/128 VUKOVO-KORDOŠ	32	32	LU SRNDAĆ ILOK
	XVI/129 VUČEDOL	24	36	LU ZRINSKI VUKOVAR
	XVI/143 GRADAC	6	6	LD BOROVO BOROVO
	XVI/152 UGLJARA	12	15	LD UGLJARA APŠEVCI
	XVII/3 DINARA - CRVENE GREDE	40	20	LU SVILAJA Vrlika
	XVII/4 KAMEŠNICA	26	20	LU JAREBICA Otok (Dalmatinski)
	XVII/19 VRDOVO	36	27	LD SINJ Sinj
	XVII/21 TOVARNICA - JELINAK	40	30	LU TOVARNICA Tijarica
	XVII/22 KOPRŠNICA - TIJARICA	40	30	LD JAREBICA Trilj
	XVII/126 LOVREĆ-STUDENCI	32	16	LU GRADINA LOVREĆ
	XVII/128 ZAGVOZD	24	12	LU ZEC Zagvozd
	XVII/130 PROLOŽAC	16	8	LU RIČINA PROLOŽAC
SD	XVII/131 IMOTSKI	10	5	LU IMOTSKA KRAJNA IMOTSKI
	XVII/133 POLJICA-MIJACA	20	10	LD ZAGORA VRGORAC
	XVII/134 VRGORIČKI RASTOK	8	6	LU RASTOK VRGORAC
	XVII/135 VRGORIČKO JEZERO	4	2	LU SPLIT SPLIT

	XVII/146 RUNOVIĆ	0	5	LU OSOJE RUNOVIĆ
	XVII/155 RIČICE	12	6	LU GRIVNA RIČICE
DN	XIX/2 MALA ŽABA METKOVIĆ	5	3	LD LISKA Metković
	XIX/8 SLIVNO METKOVIĆ	12	9	LU PREPELICA Opuzen
	XIX/101 Konavle	40	60	LD Konavle Gruda
	XIX/102 Župa Dubrovačka	4	3	LD ŽUPA Mandaljena
	XIX/103 Dubrava	14	11	LU DUBRAVA Dubrovnik
	XIX/104 Slano	16	12	LU DUBRAVA Dubrovnik
	XIX/105 Rudine	26	20	LU PRIMORJE Visočani
	XIX/117 Metković	4	3	LD LISKA Metković
	XIX/118 Norin	6	6	LD MUFLON Metković
	XIX/119 Prolog - Dubrave	0	6	LD JAREBICA POJEZERJE

DODATAK II

Obrazac za dostavu uzoraka odstrijeljenih divljih svinja ili lešina divljih svinja na laboratorijsko pretraživanje na klasičnu/afričku svinjsku kugu



Obrasci će biti dostavljeni lovoovlaštenicima sukladno popisu iz Dodatka I i ovlaštenim veterinarskim organizacijama