



BOLEST KVRGAVE KOŽE (BKK)

OPĆENITO O BOLESTI

Bolest kvrgave kože (BKK) je virusna zarazna bolest od koje oboljevaju isključivo goveda. Bolest se očituje vrućicom, inapetencijom, stvaranjem edema te čvorića po koži i sluznicama, povećanjem limfnih čvorova, iscjetkom iz nosa, suženjem, smanjenjem mliječnosti, otečenjem nogu te hromošću. Klinički znakovi su izraženiji u mliječnim krava na vrhuncu laktacije te u mlade teladi. Bolest je proširena po afričkom kontinentu te na Srednjem Istoku, a posljednjih godina zabilježeni su slučajevi bolesti u Turskoj. U 2015. godini bolest se pojavila u Grčkoj, a tijekom 2016. godine bolest se proširila na Bugarsku i Makedoniju.



EKONOMSKI ZNAČAJ

Bolest ima veliko ekonomsko značenje zbog posrednih šteta i gubitaka koji nastaju u proizvodnji (pad mliječnosti, smanjena kvaliteta kože) te zbog zabrane premještanja i prometa životinjama unutar i izvan zaraženog područja.

PRIJENOS BOLESTI

Bolest se najčešće prenosi mehanički insektima (komarci, muhe, krpelji, itd.) ili kontaminiranim iglama. Smatra se da insekti mogu biti preneseni iz zaraženih u nezaražena područja putem vjetra ili prijevoznim sredstvima. **Bolest se ne prenosi na ljude.**

KLINIČKA SLIKA

Čvorići na koži veličine 5-50 mm (okrugli i uzdignuti iznad kože), obično nastanu dva dana nakon izbijanja vrućice (porasta temperature) na koži glave, vrata, genitalnom području, perineumu, udovima. Čvorići mogu prekrivati cijelo tijelo ili ih može izbiti samo nekoliko. Čvorići mogu spontano nestati ili ulcerirati stvarajući ožiljke.

DIJAGNOZA

Potvrda kliničke dijagnoze postiže se laboratorijskim pretraživanjem uzoraka krvi ili tkiva (promjene na koži).

LIJEČENJE

Bolest se ne liječi.



PREVENCIJA BOLESTI

Jednom kada je bolest prisutna na određenom području vrlo je teško spriječiti njeno daljnje širenje.

Preventivne mjere koje mogu podići stupanj zaštite stada od BKK su slijedeće:

BIOSIGURNOSNE MJERE

1. Budući da se bolest može prenositi živim životinjama i prijevoznim sredstvima (putem vektora) potrebno je spriječiti ulazak ili otvaranje takvih vozila odnosno kontrolirati gospodarstva sve dok nije odrađena završna dezinfekcija upotrebom propisanih sredstava.
2. Zaštita životinja od insekata (primjenom odgovarajućih repelenata i/ili premještanjem životinja na ona mjesta na gospodarstvu na kojima su insekti manje aktivni).

OPĆENITE MJERE PRIMJENOM KOJIH SE SMANJUJE RIZIK OD POJAVE BKK TE DRUGIH BOLESTI:

1. Dezbarijere na ulazu u gospodarstvo/objekt
2. Jednokratni nazuvci i zaštitna odijela za posjetitelje
3. Dezinfekcija i dezinfekcija prijevoznih sredstava prije i nakon kretanja

ŠTO TREBA SPRIJEČITI

- ⇒ Kontakt sa životinjama nepoznatog zdravstvenog statusa (npr. na ispaši)
- ⇒ Premještanje životinja bez zaštite na područja s visokom aktivnošću vektora

POTREBNO OBRATITI PAŽNJU NA SLIJEDEĆE

I vaše stado može biti ugroženo!

Vrlo je važno pratiti zdravstveno stanje svih životinja u stadu!

Ako se pojave znakovi bolesti posjednik životinja mora o tome bez odgađanja obavijestiti veterinara!

Pravovremena prijava neophodna je za kontrolu i sprečavanje daljnjeg širenja bolesti!

**ZA SVE DODATNE INFORMACIJE OBRATITE SE
UPRAVI ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
(KONTAKT TEL: 01/6443 540, e-mail: veterinarstvo@mps.hr)**

Izvor informacija:

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3986.pdf

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.14_LSD.pdf

Slike: EuFMD, Bulgarian Food Safety Agency