

## KAKO OMAMITI GOVEDA (PENETRIRAJUĆI ŠERMEROV PIŠTOLJ)

Omamljivanje je ključno da bi goveda bila u besvjesnom stanju prije klanja. Tada ih možete **bezbolno zaklati**. Važno je dobro sputati goveda prije omamljivanja. Ovi savjeti mogu vam pomoći u učinkovitom omamljivanju goveda.

Omamljivanje goveda dopušteno je samo radnicima koji imaju uvjerenje o osposobljenosti.

### O GOVEDIMA

- Goveda su životinje koje žive u stadima i vole se okupljati u grupe
- Ako se izdvoje iz grupe, postat će uznemirene, a možda i opasne
- **Vole:** dobro osvijetljena područja
- **Ne vole:** blještava ili izrazito jarka svjetla, sjene, prepreke, oštre zavoje, nagle pokrete/buku, skliske podove
- Svaka krava ili bik može se ponašati na drukčiji način




### PRIJE OMAMLJIVANJA

- Odaberite Šermerov pištolj u skladu s vrstom krave ili bika koje ćete omamiti
- Slijedite upute proizvođača za pravilno podešavanje pištolja
- Pravilno **održavajte** svoj pištolj
- Ako koristite pištolj s nabojem, držite naboj na suhom mjestu i pripremite rezervni naboj
- Neka vam pričuvna oprema za omamljivanje bude pri ruci

### NAMJESTITE PIŠTOLJ

Kada krava ili bik stignu u obor za sputavanje, mogu biti uznemireni. **Dopustite životinji da se smiri** kako biste mogli preciznije pucati i polako pomičite pištolj.

- **Meta:** sjecište 2 zamišljene linije koje se protežu od sredine svakog roga/rožnog pupoljka do vanjskog kuta suprotnog oka
- Ciljajte **niz kralježnicu**
- **Za bikove** ili vodene bivole, naciljajte 1 cm lijevo ili desno od sredine glave



Ako upotrebljavate naboj, pripremite dva pištolja i koristite ih naizmjenično radi sprečavanja pregrijavanja. Drugi pištolj ne predstavlja pričuvnu metodu omamljivanja – i dalje morate imati pričuvnu metodu.

# TIJEKOM OMAMLJIVANJA

## PREPORUČENI PARAMETRI ZA OMAMLJIVANJE GOVEDA


| Kategorija | Punjenje (zrna) | Kalibar     | Promjer klina (mm) | Dužina klina (cm) | Brzina (m/s) |
|------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Telad      | 1,25-2,5        | ,22         | 7                  | 8                 | ≥50          |
| Odrasli    | 3-4             | ,22-,25-,33 | 9                  | 12-15             | ≥50          |
| Bik        | 4-6             | ,25-,33     | 9                  | 15                | ≥50          |

## PREGLEDAJTE OPREMU

- Pazite da se pištolj ne pregrije
- Pazite da se klin sasvim uvuče natrag u pištolj nakon pucnja
- Zamijenite istrošene podloške

## PROVJERITE ZNAKOVE SVIJESTI


Pobrinite se za to da životinja bude u besvjesnom stanju prije uboda.



# NAKON OMAMLJIVANJA

## AKO SU KRAVA ILI BIK JOŠ PRI SVIJESTI

- Nemojte iskrvariti životinju
- Ponovite omamljivanje, ali na drugom mjestu i pomoću drugog uređaja:
  - Ako je mjesto prvog pucnja bilo pogrešno, ponovno pucajte na ispravno mjesto
  - Ako je mjesto pucnja bilo ispravno, pucajte 10 mm više i 5 mm dalje od središta, ciljajući mozak
- Provjerite što je pošlo krivo
- Riješite probleme prije nego što nastavite s omamljivanjem



## ZAKOLJITE GOVEDO

- Iskrvarite govedo unutar 60 sekundi od omamljivanja

## POTVRDITE SMRT

### Provjerite sljedeće:

- Nema spontanih pokreta
- Nema reakcije na štipanje nosa/uha
- Nema treptanja prilikom dodirivanja oka
- Nema zvukova
- Mlohavo tijelo
- Oči izokrenute prema gore
- Nema disanja – govedo može naglo udahnuti tik prije smrti
- Oči izokrenute prema gore
- Proširene zjenice
- Krvarenje je prestalo
- Nema otkucaja srce

