


**DODATAK I**

**SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA VMP**

Ministarstvo poljoprivrede

  
7. rujna 2012.

**ODOBRENO**

## 1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

CheckMite+<sup>®</sup>, impregnirana traka za košnicu

## 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 traka CheckMite+<sup>®</sup> sadrži:

### Djelatna tvar:

Kumafos

1,36 g

### Pomoćne tvari:

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

## 3. FARMACEUTSKI OBLIK

Impregnirana traka za košnicu.

## 4. KLINIČKE POJEDINOSTI

### 4.1 Ciljne vrste životinja

Pčele.

### 4.2 Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Kontrola i suzbijanje invazije pčelinjih zajednica grinjom *Varroa destructor*.

### 4.3 Kontraindikacije

CheckMite+<sup>®</sup> ne smije se primjenjivati prilikom uzgoja matice i neposredno prije vrcanja meda.

### 4.4 Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja

Pri višekratnoj primjeni akaricidi se nakupljaju u vosku. Stoga u suvremenom pčelarenju treba zamijeniti saće svake 3-4 godine, a još je bolje akupnu izmjenu obaviti unutar 2-3 godine. To znači da se svake godine u košnicama prosječno zamijeni 1/3 okvira sa saćem. Poštujući ta pravila dobre proizvođačke prakse osigurava se higijenski ispravan med.

Kako bi se izbjegla pojava rezistencije grinja na kumafos, CheckMite+<sup>®</sup> trake može se koristiti u rotacijskim programima s drugim akaricidima (amitraz, flumetrin, akrinatri, oksalna kiselina i dr.).

U krajevima gdje je relativno veliki broj pčelinjaka preporučuje se nakon završenog tretmana s CheckMite+<sup>®</sup> trakama, a kako bi se otklonila opasnost reinvazije grinjama, pčelinje zajednice bez legla dodatno tretirati oksainom kiselinom (pr. tijekom prosinca u kontinentalnom području RH).

Ministarstvo poljoprivrede

CheckMite+<sup>®</sup>

veljača 2012.

ODOBRENO

Nakon tretiranja pčelinjih zajednica s 10%-tnim kumafos-trakama propolis, pelud i matična mliječ smiju se koristiti za primjenu u ljudi te izradu farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda koji se apliciraju izvana.

#### 4.5 Posebne mjere predostrožnosti za primjenu

##### **Posebne mjere predostrožnosti za primjenu na životinjama**

CheckMite+<sup>®</sup> PVC-trake ne smiju u pčelinjoj zajednici ostati dulje od 42 dana.

Antiparazitske 10%-tne kumafos-trake ne smije se višekratno upotrebljavati (postaju nedjelotvorne i potiču razvoj rezistencije grinja).

##### **Posebne mjere predostrožnosti koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama**

Treba izbjegavati dodir antiparazitskih traka s kožom. Prilikom rukovanja s trakama (posebice kod njihova presijecanja - vidi Dodatne informacije) treba nositi zaštitne rukavice. Za vrijeme rada sa svakim ektoparazitocidom ne smije se jesti, piti i pušiti, a nakon korištenja ruke treba oprati vodom i sapunom.

U slučaju otrovanja s kumafosom (neodgovarajuće rukovanje) javit će se znakovi toksičnosti OFS (cuženje zjenica, drhtanje mišića, povraćanje, proljev). U takvim okolnostima mora se odmah zatražiti pomoć liječnika. Antidot je 1%-tna otopina atropin sulfata, a i.m. doza za čovjeka je 0.2-0.5 mL (2-5 mg atropin sulfata/osoba). Ako je potrebno (pogoršanje simptoma), injekcija atropin sulfata smije se ponoviti nakon 15-30 min.

#### 4.6 Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

Tijekom tretiranja pčela veterinarsko-medicinskim proizvodom CheckMite+<sup>®</sup> može se poremetiti uzgoj matica i nesenje jajašca.

Ako se primijete nuspojave VMP potrebno je postupiti u skladu s člankom 65. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 84/08).

#### 4.7 Primjena tijekom gravidnosti, laktacije ili nesenja

Tretiranje pčela CheckMite+<sup>®</sup> PVC-trakama može poremetiti uzgoj matica i nesenje jajašca.

#### 4.8 Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Istodobno s CheckMite+<sup>®</sup> trakama ne preporučuje se u košnicu stavljati druge ektoparazitocide za suzbijanje grinjavosti pčela.

#### 4.9 Količine koje se primjenjuju i način primjene

U svaku pčelinju zajednicu između okvira u područje legla objese se po 2 trake CheckMite+<sup>®</sup> i ostave u košnici tijekom 42 dana. Treba istodobno tretirati sve zajednice na pčelinjaku, a također i zajednice u bližoj okolini.

Optimalno je pčele tretirati u proljeće prije početka paše (ukos nektara) ili u jesen nakon što je uklonjen med iz košnice.